

Cuprum metallicum praeparatum

Verreibungen

Homoopathische Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung -

Zusammensetzung

9		
Arzneimittelbezeichnung	10 g enthalten: Arzneilich wirksamer Bestand	teil:
Cuprum metallicum praeparatum D6	Cuprum metallicum praeparatum Trit. D6	10 g
 Cuprum metallicum praeparatum D12 	Cuprum metallicum praeparatum Trit. D12	1ð g
Cuprum metallicum praeparatum D20	Cuprum metallicum praeparatum Trit. D20	10 g
Cuprum metallicum praeparatum D30	Cuprum metallicum praeparatum Trit. D30	10 g

Darreichungsform und Packungsgröße

20 g Verreibung

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Registrierte homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Diese Arzneimittel enthalten Lactose. Bitte nehmen Sie Cuprum metallicum praeparatum Verreibungen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren sollen Cuprum metallicum praeparatum Verreibungen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.



Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Wie alle Arzneimittel sollten Cuprum metallicum praeparatum Verreibungen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet

D6: 1 - 3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver einnehmen;

D12: bis zu 2 mal täglich 1 Messerspitze Pulver einnehmen; D20, D30: maximal 1 mal täglich 1 Messerspitze Pulver einnehmen.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

Hinweis

Sie dürfen die Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: April 2006

Ergänzende Information

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.